



CUDURKA DHICISKA (BRUCELLOSIS)

Cudurka dhicisku waa cudur la kala qaado oo u sababo bakteeriyada nooca loo yaqaano Burusela (*Brucella*). Bakteeriyadan oo ay inta badan isu gudbiyaan xooluhu ayaa cudur ku rida xayawaan badan oo kala duwan oo ah laf-dhabarley.

Calaamadaha

Marka uu galo bini'aadanka, cudurka dhicisku (brucellosis) waxa uu sababi karaa tiro badan oo ah calaamado oo eeg calaamadaha ifilada, waxana calaamadahaa ka mid noqon kara qandhada ama xumadda, dhididka, madax-xanuunka, dhabar-xanuunka iyo tabar-dari jidhka. Wuxuu dhici cudur duran oo ku dhaca hababka dareemeyaasha dheweera ama darbiga wadnaha. Cudurka dhicisku waxa kale oo uu keeni karaa calaamado mudo dheer jira oo ay ka mid yihiin qandho soo noqnoqota, xanuun xaglaha ah iyo daal.

Cudur-qaadisata

Guud ahaan bini'aadanku waxay cudurka ka qaadaan saddex siyaabood: cunista ama cabbista wax leh bakteeriyada *Brucella*, noolaha bakteeriyada oo qofka hawada u soo raaca (neefsasho), ama bakteeriyada oo jidhka qofka ka gasha dhaawac maqaarka ah. In laba qof si toos u kala qaadan cudurka dhiciska aad bay dhif u tahay. Wuxuu dhici karta in hooyooyinka naaska nuujiyaa ay u gudbiyaan cudurka ilmahooda. Wuxuu kale oo la soo sheegay in cudurka lagu kala qaaday galmo.

Talaalka/Ka-hortagga

Ma jiro talaal loo heli karo bini'aadanka.

Daweynta

Inkastoo daweynta cudurka dhicisku ay dhib noqon karto, dhakhaatiirtu waxay qori karaan dawooyin antibiyotiko ah oo waxtar leh. Caadi ahaan, waxa la isticmaala ‘doxycycline’ iyo ‘rifampin’ oo la raaciyyay mudo ah lix todobaad si loo hortago cudurka oo dib u soo noqda. Iyadoo ay ku xidhan tahay wakhtiga la bilaabay dawada iyo heerka cudurka, boqsashadu waxay qaadan kartaa dhawr todobaad ilaa dhawr bilood. Dhimashada cudurka loo dhintaa way yar tahay (<2%) waxana caadi ahaan ay ka timaadaa wadne barar (barar ku dhaca gidaarka wadnaha).

Wixii ah war dheeraad ah, wac North Dakota Department of Health (Waasaaradda Caafimaada ee Waqooyiga Dakota) oo leh lambarka 701.328.2378.